

鲜北败酱草

Xianbeibaijiangcao

SONCHI BRACHYOTI HERBA RECENS

本品为菊科植物长裂苦苣菜 *Sonchus brachyotus* DC. 的新鲜全草。春、夏二季开花前采挖，除去泥沙，鲜用。

【性状】 本品长可达 100cm，根细长圆柱形，有多数须根。茎不分枝，有纵条纹，基部直径可达 1.2cm，基生叶与下部茎生叶狭椭圆形至披针形，长 5~20cm，宽 1~3cm，不分裂或羽状半裂至深裂，无毛，基部半抱茎至短耳状抱茎，边缘具细齿且常波状具齿。中部与上部茎生叶与下部叶相似但较小。气微，味微苦。

【鉴别】 本品茎横切面：木栓细胞 2~5 列，棕黄色，扁平，壁薄，木栓化，外侧 1~2 列通常木化；有的无木栓层，仅其表皮细胞壁栓化且木化。皮层为 10 余列切向延长的薄壁细胞，有的近等径形。韧皮部有乳汁管，直径 10~26 μ m，单个散在或数个成群，内含浅棕色物，有众多细小的无色颗粒状物和少数树脂块。木质部导管单个散在，或 2~10 个径向相连或成群。髓常中空。薄壁细胞中多充满大型的菊糖块。

叶表面观：基生叶的上、下表皮细胞呈类多边形，上表皮细胞垂周壁平直，气孔较少，下表皮细胞垂周壁略弯曲，气孔众多；气孔为不等式或不定式，副卫细胞 3~5 个；幼叶的上、下表面均有少数多细胞非腺毛，由 2~7 个细胞组成，壁极薄，有的细胞扁缩，顶端 1~2 个细胞常膨大。

【性味与归经】 苦，寒。归胃、大肠、肝经。

【功能与主治】 清热解毒，消肿排脓。用于咽喉肿痛，疮疖肿毒，肺痈，肠痈，热痢。

【用法与用量】 20~30g。外用适量。

【贮藏】 冷藏，或置阴凉潮湿处。

起草单位：湖南省中医药研究院

复核单位：湖南省药品检验检测研究院