

## 柿叶

### Shiye

#### KAKI FOLIUM

本品为柿科植物柿 *Diospyros kaki* Thunb. 的干燥叶。秋季采收，除去杂质，晒干。

**【性状】** 本品呈椭圆形或近圆形，全缘，边缘微反卷。上表面灰绿色或黄棕色，较光滑，下表面淡绿色，具短柔毛。中脉及上侧脉凹下或平坦，侧脉每边 5~7 条，向上斜生，近叶缘网结，脉上有密生褐色绒毛。叶柄长 8~20mm。质脆。气微，味微苦。

**【鉴别】** 取本品粉末 1g，加甲醇 50ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取柿叶对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取熊果酸对照品，用甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2025 年版四部通则 0502)试验，吸取上述三种溶液各 5 $\mu$ l 分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸(20:4:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】** 水分 不得过 13.0% (《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法)。

总灰分 不得过 13.0% (《中国药典》2025 年版四部通则 2302)。

**【浸出物】** 照水溶性浸出物测定法 (《中国药典》2025 年版四

部通则 2201) 项下的热浸法测定, 不得少于 14%。

**【性味与归经】** 苦, 寒。归肺经。

**【功能与主治】** 止咳定喘, 生津, 止血。用于咳喘, 消渴及各种内出血。

**【用法与用量】** 5~15g, 重症加倍。外用适量。

**【贮藏】** 置通风干燥处。

---

起草单位: 湖南省药品检验检测研究院

复核单位: 益阳市食品药品检验所