

姜 僵 蚕

Jiangjiangcan

本品为蚕蛾科昆虫家蚕 *Bombyx mori* Linnaeus 4~5 龄的幼虫感染（或人工接种）白僵菌 *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuillant 而致死的干燥体的加工炮制品。

【炮制】 取净僵蚕，用姜汁拌匀，闷至姜汁吸尽，置容器内用文火炒至黄棕色，取出，放凉；或蒸至身软，取出，干燥。

每 100kg 僵蚕，用生姜 10kg。

【性状】 本品略呈圆柱形，多弯曲皱缩。长 2~5cm，直径 0.5~0.7cm。表面灰黄色至黄棕色。头部较圆，足 8 对，体节明显。质硬而脆，易折断，断面平坦，外层白色，中间有亮棕色或亮黑色的丝腺环 4 个。气微腥，味微咸，微辛辣。

【鉴别】 本品粉末灰棕色或灰褐色。菌丝体近无色，细长卷曲缠结在体壁中。气管壁碎片略弯曲或呈弧状，具棕色或深棕色的螺旋丝。表皮组织表面具网格样皱缩纹理以及纹理突起形成的小尖突，有圆形毛窝，边缘黄色；刚毛黄色或黄棕色，表面光滑，壁稍厚。未消化的桑叶组织中大多含草酸钙簇晶或方晶。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版 四部 通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2025 年版 四部 通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》2025 年版 四部 通则 2302）。

黄曲霉毒素 照真菌毒素测定法（《中国药典》2025 年版 四部 通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5μg，含黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 的总量不得过 10μg。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版 四部 通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 20.0%。

【性味与归经】 咸、辛，微温。归肝、肺、胃经。

【功能与主治】 息风止痉，祛风止痛，化痰散结。用于肝风夹痰，惊痫抽搐，小儿急惊风，破伤风，中风口喎，风热头痛，目赤咽痛，风疹瘙痒，发颐疔腮。

【用法与用量】 5~10g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

起草单位：四平市食品药品检验所

复核单位：延边州食品药品检验所